

A l'usage interne. Pas lu par le scanner.

Directions

- Veuillez utiliser un crayon #2 pour remplir le formulaire.
- Les réponses en textes doivent être enregistrées avec l'interface web.
- Veuillez répondre à toutes les questions sauf autre indication.
- Veuillez noircir entièrement les cases de marquage.

Type de question

- à réponse unique
- à choix multiple
- questions obligatoires

Niveau d'intervention

- cervical supérieur cervico-thoracique thoracique thoraco-lombo-sacré lombo-sacré coccyx
- cervical moyen, infér. cervico-thoraco-lombaire thoraco-lombaire lombaire sacré

Nom	Prénom	Sexe
Rue	N° du patient	
Pays	Code postal	Ville
Numéro de sécurité sociale (no. AVS)		Date de naissance (JJ.MM.AAAA)

Contrôle

Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Délai du suivi

- 6 semaines 1 an
- 3 mois 2 ans
- 6 mois autre (ans)
- (Ex. 4 mois=0.33 ans (4/12))

Travail

- sans travail depuis OP reprise, nouvel emploi femme au foyer
- reprise partielle, même emploi licencié enfant/étudiant
- reprise plein temps retraité depuis OP autre
- reprise, nouvel arrêt retraité avant OP

Spécifiez but/mesures uniquement en relation sur ce qui a été indiqué en question 'Pathologie principale' dans formulaire "OPÉRATION".

Buts chirurgicaux atteints

- aucun
- soulagement des douleurs axiales
- soul.d.douleurs radiculaires /périphériques
- amélioration fonctionnelle
- amélioration du déficit moteur
- amélioration du déficit sensitif
- amél. de la fonct. sphinctérienne/sexuelle
- stabilisation rachidienne
- arrêt de la progression de la déformation
- décompression prophylactique
- objectifs esthétique
- diagnostique
- autre

Buts chirurg. partiellement atteints

- aucun
- soulagement des douleurs axiales
- soul.d.douleurs radiculaires /périphériques
- amélioration fonctionnelle
- amélioration du déficit moteur
- amélioration du déficit sensitif
- amél. de la fonct. sphinctérienne/sexuelle
- stabilisation rachidienne
- arrêt de la progression de la déformation
- décompression prophylactique
- objectifs esthétique
- diagnostique
- autre

Buts chirurgicaux non atteints

- aucun
- soulagement des douleurs axiales
- soul.d.douleurs radiculaires /périphér.
- amélioration fonctionnelle
- amélioration du déficit moteur
- amélioration du déficit sensitif
- amél. de la fonct. sphinctérienne/sex.
- stabilisation rachidienne
- arrêt de la progression de la déform.
- décompression prophylactique
- objectifs esthétique
- diagnostique
- autre

Traitement médical pour l' intervention / pathologie spinale

- aucun opiacés forts (WHO III) vitamines B
- AINS, paracétamol (WHO I) corticoïdes antibiotiques
- opiacés faibles (WHO II) antidépresseurs autre

Résultat global (selon examinateur)

- non évaluable bon mauvais
- excellent moyen

Réhabilitation

- aucune réhab. externe / physio autre
- environnement privé réhab. interne / physio

Décision

- arrêt du suivi révision prévue
- poursuite du suivi autre intervention primaire prévue

Commentaire concernant le suivi

Complications

Complications

- non (Réponse 'non' exclut toutes les questions suivantes.)
- oui

Date

- de J0 à J28 post-OP
- de J29 à J180 post-OP
- après le 6e mois post-OP

Type

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> troubles sensitifs | <input type="checkbox"/> spondylite | <input type="checkbox"/> dégénérescence d'un segm. adjacent |
| <input type="checkbox"/> troubles moteurs | <input type="checkbox"/> discite | <input type="checkbox"/> récurrence tumorale |
| <input type="checkbox"/> troubles vésicaux/intestinaux | <input type="checkbox"/> hématome épidual | <input type="checkbox"/> déséquilibre rachidien |
| <input type="checkbox"/> pseudarthrose | <input type="checkbox"/> hématome extravertébral | <input type="checkbox"/> cardiovasculaire |
| <input type="checkbox"/> rupture d'implant | <input type="checkbox"/> erreur de niveau | <input type="checkbox"/> foie/gastro-int. |
| <input type="checkbox"/> instabilité | <input type="checkbox"/> malposition d'implant | <input type="checkbox"/> système nerveux central |
| <input type="checkbox"/> fistule de LCR | <input type="checkbox"/> récurrence clinique | <input type="checkbox"/> fracture d'une structure vertébrale |
| <input type="checkbox"/> infection superficielle | <input type="checkbox"/> complication de la greffe | <input type="checkbox"/> thromboembolie |
| <input type="checkbox"/> infection profonde | <input type="checkbox"/> séquelle d'anesthésie | <input type="checkbox"/> autre |

Conséquences thérapeutiques

- aucune
- pas d'intervention, hospitalisation
- pas d'interv., suivi externe
- réintervention
- autre

Conséquences individuelles

- aucune
- douleur plus importante
- invalidité prolongée
- activité sociale réduite
- invalidité permanente
- autre

Examineur

Commentaires concernant les complications