

De utilización interna solamente. No leído por el escáner.

Instrucciones

- Use lápiz nº2 para marcar.
- Las respuestas de texto deben ser introducidas en la interfaz de la web.
- Se debe responder a todas las preguntas
- Marcar rellenando toda la casilla

Tipo de pregunta

- solo una respuesta
- se ruega especificar
- varias respuestas permitidas
- preguntas obligatorias

Nivel de intervención

- cervical alta
- cervicotorácica
- torácica
- toraco-lumbo-sacra
- lumbosacra
- cóccix
- cervical media y baja
- cervico-toraco-lumbar
- toracolumbar
- lumbar
- sacra

Apellidos		Nombre		Sexo
Dirección			Nº Hist. Clínica	
Código país	Código postal	Ciudad		
Número de la Seguridad Social			Fecha nac. (DD.MM.AAAA)	

Seguimiento

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Año 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Intervalo de seguimiento

- 6 semanas
 - 1 año
 - 3 meses
 - 2 años
 - 6 meses
 - otro (años)
- (Ej. 4 meses=0.33 (4/12))

Situación laboral

- no trabaja desde la operación
- distinto trabajo
- ama de casa
- tiempo parcial, mismo trabajo
- despedido
- niño/estudiante
- reintegrado totalmente
- jubilado desde operación
- otra
- volvió al trabajo y lo abandonó
- jubilado antes operación

Solo comentar aquello que se indico en el formulario "CIRUGÍA"

Metas terapéuticas conseguidas

- ninguna
- alivio de dolor axial
- alivio de dolor periférico
- mejoría función
- mejoría motriz
- mejoría función sensitiva
- mejoría incontinencia/sexual
- estabilización espinal
- detener progreso de deformación
- decompresión profiláctica
- mejoría estética
- medidas diagnósticas
- otro

Metas terapéuticas conseguidas en parte

- ninguna
- alivio de dolor axial
- alivio de dolor periférico
- mejoría función
- mejoría motriz
- mejorar función sensitiva
- mejoría incontinencia/sexual
- estabilización espinal
- detener progreso de deformación
- decompresión profiláctica
- mejoría estética
- medidas diagnósticas
- otro

Metas terapéuticas no conseguidas

- ninguna
- alivio de dolor axial
- alivio de dolor periférico
- mejoría función
- mejoría motriz
- mejorar función sensitiva
- mejoría incontinencia/sexual
- estabilización espinal
- detener progreso de deformación
- decompresión profiláctica
- mejoría estética
- medidas diagnósticas
- otro

Medicamento para cirugía espinal

- ningún
- opiáceos fuertes (WHO III)
- compl.vitamínico B
- AINES,Paracetamol (WHO I)
- esteroides
- antibióticos
- opiáceos apagados (WHO II)
- antidepresivos
- otro

Resultado en general (examinador)

- no aplica
- bueno
- malo
- excelente
- regular

Rehabilitación

- ninguna
- fisioterapia ambulatoria
- otra
- a domicilio
- fisioterapia en el hospital

Decisión

- cese de seguimiento
- se prevé revisión
- seguimiento adicional
- se prevé intervención distinta

Comentarios acerca del seguimiento

Complicaciones

Complicaciones

- no (esta respuesta excluye las preguntas restantes)
- sí

Tiempo

- precoz, día cirug.-28 días postop.
- 2-6 meses
- tardía, > 6 meses

Tipo

- disfunción sensorial
- disfunción motora
- disfunción vesicular/intestinal
- no fusión
- fallo de implante
- inestabilidad
- pérd.d.líqu.cerebrospinal/pseudomeningocele
- infección herida superficial
- infección profunda de herida
- espondilitis
- discitis
- hematoma epidural
- hematoma extravertebral
- error de nivel
- mala posición del implante
- reparación de síntomas
- complicación del injerto
- secuelas anestésicas
- patología segmento adyacente
- tumor recurrente
- decompensación de columna
- cardiovascular
- gastrointestinal
- sistema nervioso central
- fractura estructuras vertebrales
- tromboembolismo
- otro

Consecuencias terapéuticas

- ninguna
- no-quirúrgicas hospitalaria
- no-quirúrgica ambulatoria
- reintervención
- otra

Consecuencias personales

- ninguna
- aumento de dolor
- minusvalía prolongada
- reducción de actividades sociales
- minusvalía permanente
- otra

Examinador:

Comentarios acerca de complicaciones