

A l'usage interne. Pas lu par le scanner.

Directions

- Veuillez utiliser un crayon #2 pour remplir le formulaire.
- Les réponses en textes doivent être enregistrées avec l'interface web.
- Veuillez répondre à toutes les questions en bleu.
- Veuillez noircir entièrement les cases de marquage.

Type de question

- à réponse unique veuillez préciser
- à choix multiple questions obligatoires

Niveau d'intervention

- cervical supérieur cervico-thoracique thoracique thoraco-lombo-sacré lombo-sacré coccyx
- cervical moyen, infér. cervico-thoraco-lombaire thoraco-lombaire lombaire sacré

Nom		Prénom		Sexe	
Rue			N° du patient		
Pays		Code postal		Ville	
Numéro de sécurité sociale (no. AVS)				Date de naissance (JJ.MM.AAAA)	

Contrôle

Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Année 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Délai du suivi

- 6 semaines 1 an
- 3 mois 2 ans
- 6 mois autre (ans)
(Ex. 4 mois=0.33 ans (4/12))

Travail

- sans travail depuis OP reprise, nouvel emploi femme/homme au foyer
- reprise partielle, même emploi licencié enfant/étudiant
- reprise plein temps retraité depuis OP autre
- reprise, nouvel arrêt retraité avant OP

Spécifiez but/mesures uniquement en relation sur ce qui a été indiqué en question 'Objectif(s) du traitement' dans formulaire "OPÉRATION".

Buts chirurgicaux atteints

- aucun
- libération des douleurs axiales
- libération des douleurs périphériques
- amélioration fonctionnelle
- amélioration du déficit moteur
- amélioration du déficit sensitif
- améliorations troubles sphinctériens
- stabilisation rachidienne
- arrêt de la progression de la déformation
- correction de déformation
- décompression prophylactique
- objectifs esthétique
- diagnostique
- autre

Buts chirurg. partiellement atteints

- aucun
- libération des douleurs axiales
- libération des douleurs périphériques
- amélioration fonctionnelle
- amélioration du déficit moteur
- amélioration du déficit sensitif
- améliorations troubles sphinctériens
- stabilisation rachidienne
- arrêt de la progression de la déformation
- correction de déformation
- décompression prophylactique
- objectifs esthétique
- diagnostique
- autre

Buts chirurg. partiellement atteints

- aucun
- libération des douleurs axiales
- libération des douleurs périphériques
- amélioration fonctionnelle
- amélioration du déficit moteur
- amélioration du déficit sensitif
- améliorations troubles sphinctériens
- stabilisation rachidienne
- arrêt de la progression de la déformation
- correction de déformation
- décompression prophylactique
- objectifs esthétique
- diagnostique
- autre

Traitement médical pour l' intervention / pathologie spinale

- aucun opiacés forts (WHO III) vitamines B
- AINS, paracétamol (WHO I) corticoïdes antibiotiques
- opiacés faibles (WHO II) antidépresseurs autre

Résultat global (selon examinateur)

- non évaluable bon mauvais
- excellent moyen

Réhabilitation

- aucune réhab. externe / physio autre
- environnement privé réhab. interne / physio

Décision

- arrêt du suivi révision prévue
- poursuite du suivi autre intervention primaire prévue

Commentaire concernant le suivi

Complications

Complications

- non (Réponse 'non' exclut toutes les questions suivantes.)
- oui

Date

- de J0 à J28 post-OP
- de J29 à J180 post-OP
- après le 6e mois post-OP

Type

- troubles sensitifs spondylite dégénérescence d'un segm. adjacent
- troubles moteurs discite récurrence tumorale
- troubles vésicaux/intestinaux hématome épidual déséquilibre rachidien
- pseudarthrose hématome extravertébral cardiovasculaire
- rupture d'implant erreur de niveau foie/gastro-int.
- instabilité malposition d'implant système nerveux central
- fistule de LCR récurrence clinique fracture d'une structure vertébrale
- infection superficielle complication de la greffe thromboembolie
- infection profonde séquelle d'anesthésie autre

Conséquences thérapeutiques

- aucune
- pas d'intervention, hospitalisation
- pas d'interv., suivi externe
- réintervention
- autre

Conséquences inviduelles

- aucune
- douleur plus importante
- invalidité prolongée
- activité sociale réduite
- invalidité permanente
- autre

Examineur

Commentaires concernant les complications